

有效者较少,用三氯醋酸烧灼可达到快速显效,一般1~2次即可治愈,少数病人可达3次治愈。烧灼后即时可感到疼痛消失或减轻。其机理为各种病因导致黏膜溃疡面后,溃疡面周围有大量炎性细胞浸润,并形成溃疡表面附有假膜。假膜下细菌再繁殖,导致溃疡加重。该方法首先在表麻下彻底清

除了溃疡面上的假膜使其形成新创面,三氯醋酸烧灼后新创面的表面组织蛋白凝固,杀灭病毒或细菌有效控制了炎症,新黏膜迅速将创面修复使溃疡得到治愈。

作者单位:276500 山东省莒县人民医院

## 以口腔溃疡为主要表现的原发性血小板减少性紫癜

王丽萍 赵淑华

原发性血小板减少性紫癜(简称ITP)又称特发性血小板减少性紫癜,是较常见的一种出血性疾病,目前认为本病是一种与免疫有关的疾病而以口腔溃疡为主要表现的较为少见,我们自1989~1999年共收治150例,现将报道如下。

### 1 临床资料

本组患者女127例,男23例,女男比例为5.5:1,女性明显高于男性是本病的特点,平均年龄30.9岁。

临床表现:数量不等的口腔溃疡,全身无力,精神不佳,懒言,纳差,反应力下降,注意力下降,一过性眩晕。若在月经期可出现月经量增多,经期长,面色蜡黄和色素沉着。发病前有情绪低落、精神紧张、过度疲劳或感染等诱因。病程1周~1个月,反复发作是本病的又一特点。口腔溃疡可以散在口腔的任何部位,常见于舌边缘、舌尖、颊部口腔黏膜、上下唇内侧口腔黏膜及牙龈。当全身抵抗力下降时,溃疡的周围黏膜可合并感染而出现全身症状,畏寒发热、面部肿胀、血中白细胞数及中性升高。

实验室检查与结果:束臂试验阳性,轻度者血小板计数略

低于正常值,中度者血小板计数为 $80 \times 10^9/L$ ,重度者血小板计数 $60 \times 10^9/L$ 以下,部分病人可同时合并白细胞总数下降。

治疗与转归:轻度患者因口腔溃疡数量少,不伴全身症状,保持口腔清洁,解除精神压力,注意休息,不用药物可以自愈。中度患者要用溃疡散或碘甘油处理口腔溃疡面,同时服用升血药物,肌苷、维生素C及抗炎药物一般1周可治愈。重度患者需减少活动量,卧床休息,除了上述溃疡面的处理外,还需静脉使用抗炎、止血、激素、支持、补液及对症处理,辅以中成药保肝效果更佳。

### 2 讨论

ITP是一种常见病,具有反复发作的特点。若注意劳逸结合,避免过度疲劳及精神紧张保持健康的心理,是可以避免反复发作的。病人多数以一过性眩晕就诊,或以口腔溃疡首诊口腔科后转看内科而确诊。充分认识该病,早期诊断及有效治疗,是缩短病程,减轻病人痛苦,减少医药费的关键。

作者单位:835000 新疆伊犁农四师医院急诊科

## 湿润烧伤膏治疗软组织擦伤52例诊治体会

李云芬 殷战良

### 1 临床资料

本组52例中,男43例,女9例,年龄19~49岁,其中单纯擦伤20例,擦伤伴组织挫伤32例。本组病例中擦伤所伴有软组织裂伤均相对较轻。

治疗:完全清创处理后,应用湿润烧伤膏(北京光明中医烧伤创疡研究所)涂于创面上,每6~12小时给创面换药,每次换药后,涂以湿润烧伤膏,暴露创面,注意卫生。换药前应原来残留在创面上的药物及液化物拭去。

治疗结果:本组52例患者创口全部一期愈合,且瘢痕较小,无色素沉着。

### 2 讨论

擦伤是伤部与致伤物粗糙表面呈切线摩擦所致。常与挫

伤裂伤等其他类外伤并存,由于一般不会留下功能障碍而且愈合快,在临床上一般只注意严重外伤处理而忽略了擦伤,常常会留下明显的瘢痕及明显色素沉着,给患者带来一定精神压力。

湿润烧伤膏是一种外用烧伤软膏,能清热解毒,止痛生肌,被广泛用于烧伤的病人。本组病例利用湿润烧伤膏能止痛去腐生肌的功效,将其涂于创面形成一层胶膜,起到隔离和保护创面的作用,而且具有减少创面渗出,促进皮肤生长愈合的作用,减少了瘢痕的形成及色素沉着,疗效显著。

作者单位:264305 山东省荣成市邱家卫生院